



اللقاح ضد التهاب الكبد A

"التلقيح، حماية جيدة"

يحصل الشخص الذي يتلقى هذا اللقاح على حماية ضد التهاب الكبد A ومضاعفاته. و التهاب الكبد A يسببه فيروس.

المضاعفات المحتملة لالتهاب الكبد A (Hépatite A) هي:	يسبب التهاب الكبد A:	ينتقل التهاب الكبد A عن طريق:	الأمراض
<ul style="list-style-type: none"> - إصابة خطيرة في الكبد - تعب يستمر عدة أسابيع - الوفاة (0.1 إلى 0.3% من الحالات) 	<ul style="list-style-type: none"> - حرارة - تعب - فقدان الشهية - يرقان (jaunisse) - آلام في الرأس 	<ul style="list-style-type: none"> - لمس ماء أو أطعمة ملوثة ببراز شخص مصاب. - غالباً لا تظهر عند الأطفال الصغار المصابين عوارض لكن يمكنهم نقل التهاب الكبد A لمن حولهم. 	

اللقاح

يُعتبر اللقاح أفضل وسيلة للحماية ضد التهاب الكبد A ومضاعفاته. ويوصف اللقاح لأي شخص يرغب في تقليص خطر تعرضه لالتهاب الكبد A. ومن الضروري أخذ أكثر من جرعة من اللقاح للحصول على أفضل حماية ممكنة. يُعتبر اللقاح ضد التهاب الكبد A آمناً.

ما الذي يجب فعله	ردود الفعل المحتملة من اللقاح	ردود الفعل
<ul style="list-style-type: none"> - وضع ضماد رطب وبارد على مكان وخز الإبرة. 	<ul style="list-style-type: none"> - خلال 24 ساعة بعد اللقاح، يمكن أن تظهر لدى الشخص حساسية طفيفة (12 إلى 52% من الحالات)، انتفاخ واحمرار (4 إلى 13% من الحالات) في مكان وخز الإبرة. 	
<ul style="list-style-type: none"> - مراجعة الطبيب حسب خطورة العوارض. 	<ul style="list-style-type: none"> - قد يثير اللقاح ردود فعل أخرى، مثل آلام في الرأس، توعكات، آلام في المفاصل، تعب، حرارة، غثيان وقيئ، إسهال، فقدان الشهية. - تُعتبر ردود الفعل هذه غير خطيرة وتزول خلال أقل من 24 ساعة. 	
تُعتبر ردود الفعل التحسسية الخطيرة نادرة.		
في حال حصول رد فعل تحسسي خطير، سيبدأ بعد دقائق من حقن اللقاح، ويمكن للشخص الذي يعطي اللقاح معالجته. لذلك من الأفضل البقاء مع الشخص الملقح لمدة 15 دقيقة على الأقل بعد حقن اللقاح.		

للحصول على المزيد من المعلومات، الرجاء التكم مع الشخص الذي يعطي اللقاح، أو استشارة المركز المحلي للخدمات الاجتماعية CLSC التابع للمركز الصحي والخدمات الاجتماعية CSSS التابعين له أو استشارة طبيبك.