



اللقاح ضد التهاب الكبد B

"التلقيح، حماية جيدة"

يحصل الشخص الذي يتلقى هذا اللقاح على حماية ضد التهاب الكبد B ومضاعفاته. و التهاب الكبد B مرض يسببه فيروس (VHB).

المضاعفات المحتملة لالتهاب الكبد B (Hépatite B) هي:	يسبب التهاب الكبد B:	ينقل التهاب الكبد B عن طريق:	الأمراض
<ul style="list-style-type: none"> - إصابة خطيرة في الكبد - التهاب مزمن في الكبد (10% من البالغين وما قد يبلغ 90% في الرضع) - تشمع الكبد - سرطان الكبد - الوفاة (1% من الحالات) 	<ul style="list-style-type: none"> - حرارة - تعب - فقدان الشهية - يرقان (jaunisse) - آلام في الرأس 	<ul style="list-style-type: none"> - لمس أحد الأغشية المخاطية أو جرح بدم أو مني أو مفرزات المهبل لشخص مصاب. 	

اللقاح

يُعتبر اللقاح أفضل وسيلة للحماية ضد التهاب الكبد B ومضاعفاته. ويوصف اللقاح لأي شخص يرغب في تقليص خطر تعرضه لالتهاب الكبد B. ومن الضروري أخذ أكثر من جرعة من اللقاح للحصول على أفضل حماية ممكنة. يُعتبر اللقاح ضد التهاب الكبد B آمناً. وفي غالبية الحالات لا يسبب أي ارتكاس.

ما الذي يجب فعله	ردود الفعل المحتملة من اللقاح	ردود الفعل
وضع ضماد رطب وبارد على مكان وخز الإبرة.	قد يُصاب الشخص بالنتفاخ أو احمرار أو حساسية زائدة (3 إلى 29% من الحالات)، في مكان وخز الإبرة.	
أخذ نواء خافض للحرارة مثل أسيتامينوفين إذا بلغت الحرارة 38.5 درجة أو أكثر.	قد يُصاب الشخص بحرارة (1 إلى 6% من الحالات).	
مراجعة الطبيب حسب خطورة العوارض.	قد يؤثر اللقاح ردود فعل أخرى (أقل من 1% من الحالات) كالصداع والاضطرابات الهضمية والدوار والتعب.	
	تُعتبر ردود الفعل التحسسية الخطيرة نادرة. (حالة من كل 100.000 حالة)	
	في حال حصول رد فعل تحسسي خطير، سيبدأ بعد دقائق من حقن اللقاح، ويمكن للشخص الذي يعطي اللقاح معالجته. لذلك من الأفضل البقاء مع الشخص الملقح لمدة 15 دقيقة على الأقل	

للحصول على المزيد من المعلومات، الرجاء التكلّم مع الشخص الذي يعطي اللقاح، أو استشارة المركز المحلي للخدمات الاجتماعية CLSC التابع للمركز الصحي والخدمات الاجتماعية CSSS التابعين له أو استشارة طبيبك.