



اللقاح المشترك ضد المكورة الرئوية

"التلقيح، حماية جيدة"

عن طريق تلقيح طفلكم، ستحمونه ضد الإنتانات الخطيرة بالمكورة الرئوية ومضاعفاتها. ويُعتبر التهاب السحايا (إنتان أغلفة الدماغ) وتجرثم الدم (التهاب الدم) مرضان خطيران تسببهما المكورة الرئوية. وهناك أنواع مختلفة من المكورة الرئوية. ويحمي اللقاح المشترك ضد الأنواع السبعة الأكثر شيوعاً لدى الأطفال.

تنتقل المكورة الرئوية عبر:	تسبب المكورة الرئوية:	المضاعفات المحتملة للمكورة الرئوية هي:
<ul style="list-style-type: none"> - التماس بإفرازات أنف وحلق شخص مصاب. 	<ul style="list-style-type: none"> - التهاب الإذن - التهاب الجيب - التهاب الرئة - التهاب السحايا - تجرثم الدم (التهاب الدم) 	<ul style="list-style-type: none"> - الصم - أضرار دائمة في الدماغ - الوفاة

اللقاح

يُعتبر اللقاح أفضل وسيلة لحماية طفلكم ضد الإنتانات الخطيرة التي تسببها المكورة الرئوية. اللقاح المشترك ضد المكورة الرئوية يمكن إعطاؤه ابتداءً من شهرين. ويختلف عدد الجرعات بحسب عمر الطفل. ويوصف اللقاح المشترك ضد المكورة الرئوية للأطفال بين شهرين و4 سنوات، خاصةً للأطفال ذوي الحالات الصعبة التي ترفع من إمكانية الإنتان الناتج عن المكورة الرئوية أو الأطفال الذين يذهبون للحضانة. يُعتبر اللقاح ضد المكورة الرئوية آمناً.

ردود الفعل المحتملة من اللقاح	ما الذي يجب فعله
<ul style="list-style-type: none"> - بعد 24 ساعة من تلقي اللقاح، يمكن أن يظهر لدى الطفل احمرار أو انتفاخ أو حساسية في مكان وخز الإبرة (10 إلى 36% من الحالات). 	<ul style="list-style-type: none"> - وضع ضماد رطب وبارد على مكان وخز الإبرة.
<ul style="list-style-type: none"> - يمكن أن يصاب الطفل بحرارة طفيفة (15 إلى 25% من الحالات). وقد يحصل أن تسبب حرارة عالية اختلاجات لدى الطفل. 	<ul style="list-style-type: none"> - أخذ دواء خافض للحرارة مثل أسيتامينوفين إذا بلغت الحرارة 38.5 درجة أو أكثر.
<ul style="list-style-type: none"> - قد يثير اللقاح ردود فعل أخرى، مثل الهيجان وتغيرات في الشهية وفي النوم، قيئ، إسهال، طفح جلدية. 	<ul style="list-style-type: none"> - مراجعة الطبيب حسب خطورة العوارض.
ردود الفعل التحسسية الخطرة نادرة.	
<p>في حال حصول رد فعل تحسسي خطير، سيبدأ بعد دقائق من حقن اللقاح، ويمكن للشخص الذي يعطي اللقاح معالجته. لذلك من الأفضل البقاء مع الشخص الملقح لمدة 15 دقيقة على الأقل بعد حقن اللقاح.</p>	

للحصول على المزيد من المعلومات، الرجاء التكلّم مع الشخص الذي يعطي اللقاح، أو استشارة المركز المحلي للخدمات الاجتماعية CLSC التابع للمركز الصحي والخدمات الاجتماعية CSSS التابعين له أو استشارة طبيبك.