

اللقاح ضد الكلب



"التلقيح، حماية جيدة"

يحصل الشخص الذي يتلقى هذا اللقاح على حماية ضد الكلب. والكلب هو مرض مميت يسببه فيروس يصيب بعض الحيوانات. وبعد تعرض محتمل للكلب، يجب غسل الجرح بالماء والصابون لعدة دقائق.

| ينتقل الكلب عن طريق: | يسبب الكلب: | المضاعفات المحتملة للكلب هي: |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - عضه حيوان مصاب بالكلب، أو تماس جرح أو غشاء مخاطي بلعابه. | <ul style="list-style-type: none"> - ألم وتتمل في موقع العضة - اضطراب - صعوبة في البلع - اختلاجات (convulsions) | <ul style="list-style-type: none"> - الوفاة في جميع الحالات في حال عدم أخذ اللقاح |

يُعطى اللقاح عدة مرات. ومن الضروري جداً احترام المواعيد المحددة للتلقيح لكي يكون اللقاح فعالاً بالكامل. المواعيد المقبلة للتلقيح:

اللقاح

يُعطى اللقاح عندما يتعرض شخص ما لعضة حيوان يحتمل أن يكون مصاباً بالكلب، أو عندما يتعرض جرحه أو إحدى أغشيته المخاطية للعباب ذلك الحيوان. ويمكن أن يُعطى أيضاً عندما يكون شخص ما معرضاً لخطر الإصابة بفيروس الكلب. يُعتبر اللقاح ضد الكلب آمناً.

| ردود الفعل المحتملة من اللقاح | ما الذي يجب فعله |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - يمكن أن تظهر لدى الشخص حساسية أو احمرار أو انتفاخ أو حكة في مكان وخز الإبرة (10 إلى 25% من الحالات). - قد يثير اللقاح ردود فعل أخرى غير خطيرة، مثل آلام في الرأس، غثيان، آلام في البطن، دوار، آلام في العضلات، آلام في المفاصل، حرارة (1 إلى 20% من الحالات). | <ul style="list-style-type: none"> - وضع ضماد رطب وبارد على مكان وخز الإبرة. - مراجعة الطبيب حسب خطورة العوارض. |
| ردود الفعل التحسسية الخطيرة نادرة. | |

في حال حصول رد فعل تحسسي خطير، سيبدأ بعد دقائق من حقن اللقاح، ويمكن للشخص الذي يعطي اللقاح معالجته. لذلك من الأفضل البقاء مع الشخص الملقح لمدة 15 دقيقة على الأقل بعد حقن اللقاح.

للحصول على المزيد من المعلومات، الرجاء التكمّل مع الشخص الذي يعطي اللقاح، أو استشارة المركز المحلي للخدمات الاجتماعية CLSC التابع للمركز الصحي والخدمات الاجتماعية CSSS التابعين له أو استشارة طبيبك.