



اللقاح المشترك ضد الخناق، والكزاز، وشلل الأطفال

"التلقيح، حماية جيدة"

يحصل الشخص الذي يتلقى هذا اللقاح على حماية ضد الخناق، والكزاز، وشلل الأطفال ومضاعفاتها.

الأمراض	الخناق (Diptérie)	الكزاز (Tétanos)	شلل الأطفال (Poliomyélite)
	يسبب الخناق:	يسبب الكزاز:	يسبب شلل الأطفال:
	- آلام شديدة في الحلق - حرارة عالية - مشاكل تنفسية وقلبية	- تشنجات عضلية في الفك - تشنج الحبال الصوتية - تشنجات عضلية في كل الجسم	- حرارة - غثيان وقيء - توهمات عامة - شلل الذراعين والساقين (1% من الحالات)
	المضاعفات المحتملة للخناق:	المضاعفات المحتملة للكزاز:	المضاعفات المحتملة لشلل الأطفال:
	- شلل - الوفاة (5 إلى 10%) من الحالات	- الوفاة (10% من الحالات)	- مشاكل تنفسية - شلل دائم (حوالي 50% من الحالات التي تُقبل في المستشفى) - الوفاة (5% من الحالات التي تُقبل في المستشفى)

اللقاح

يُعتبر اللقاح أفضل وسيلة للحماية ضد الخناق والكزاز وشلل الأطفال. يُعطى للأشخاص الذين بلغ عمرهم 7 سنوات أو أكثر، الذين يحتاجون لحماية ضد هذه الأمراض الثلاثة. يُعتبر اللقاح المشترك ضد الخناق والكزاز وشلل الأطفال آمناً.

ردود الفعل المحتملة من اللقاح	ما الذي يجب فعله
- بعد تلقي اللقاح بعدة ساعات، يمكن أن يظهر لدى الشخص انتفاخ أو احمرار، مع أو بدون حساسية في مكان وخز الإبرة (10 إلى 85% من الحالات، حسب عدد الجرعات). يمكن أن يظهر في هذا المكان ورم صغير يختفي في الأسابيع اللاحقة.	- وضع ضماد رطب وبارد على مكان وخز الإبرة.
- قد يصاب الشخص بالحرارة (0.5 إلى 10% من الحالات)، مع أو بدون ردود فعل أكثر أهمية في مكان وخز الإبرة.	- أخذ دواء خافض للحرارة مثل أسيتامينوفين إذا بلغت الحرارة 38.5 درجة أو أكثر.
تم الإبلاغ عن حالات نادرة لآلام شديدة وضعف في الذراع، قد تستمر لعدة أسابيع (0.5 إلى 1 لكل 100.000 جرعة) ردود الفعل التحسسية الخطيرة نادرة (1 إلى 6 لكل مليون جرعة).	
في حال حصول رد فعل تحسسي خطير، سيبدأ بعد دقائق من حقن اللقاح، ويمكن للشخص الذي يعطي اللقاح معالجته. لذلك من الأفضل البقاء مع الشخص الملقح لمدة 15 دقيقة على الأقل بعد حقن اللقاح.	

للحصول على المزيد من المعلومات، الرجاء التكلّم مع الشخص الذي يعطي اللقاح، أو استشارة المركز المحلي للخدمات الاجتماعية CLSC التابع للمركز الصحي والخدمات الاجتماعية CSSS التابعين له أو استشارة طبيبك.