



## اللقاح المشترك ضد الخناق، والسعال الديكي والكزاز وشلل الأطفال هييموفيلوس إنفلونزا من نوع B (Hib)

### "التلقيح، حماية جيدة"

عن طريق تلقيح طفلكم، فإنكم تحمونه ضد الخناق، والسعال الديكي والكزاز وشلل الأطفال وهييموفيلوس إنفلونزا من نوع B ومضاعفاتها.

الإنتانات الخطيرة بالهيموفيلوس إنفلونزا B: Infections graves à (Hib)	شلل الأطفال (Poliomyélite)	الكزاز (Tétanos)	السعال الديكي (Coqueluche)	الخناق (Diphtérie)	الأمراض
تسبب الإنتانات الخطيرة بالهيموفيلوس إنفلونزا B: - التهاب النهاية (انتفاخ كبير في الحلق) - التهاب الرئة - التهاب السحايا	يسبب شلل الأطفال: - حرارة - غثيان وقيء - توعكات عامة - شلل الذراعين والساقين (1% من الحالات)	يسبب الكزاز: - تشنجات عضلية في الفك - تشنجات الحبال الصوتية - تشنجات عضلية في كل الجسم	يسبب السعال الديكي: - نوبات سعال عنيفة قد تستمر أشهرا - صعوبة في تناول الطعام، والشراب والتنفس	يسبب الخناق: - آلام شديدة في الحلق - حرارة عالية - مشاكل تنفسية وقلبية	
المضاعفات المحتملة للإنتانات الخطيرة بالهيموفيلوس إنفلونزا B : - الصم - تخلف عقلي - الوفاة (5% من حالات التهاب السحايا)	المضاعفات المحتملة لشلل الأطفال: - مشاكل تنفسية - شلل دائم (حوالي 50% من الحالات التي تقبل في المستشفى) - الوفاة (5% من الحالات التي تقبل في المستشفى)	المضاعفات المحتملة للكزاز: - الوفاة (10% من الحالات)	المضاعفات المحتملة للسعال الديكي: - التهاب الرئة - اختلاجات - أضرار في الدماغ (حالة من أصل كل 11000 حالة) - الوفاة (0.4% لدى الرضع)	المضاعفات المحتملة للخناق: - شلل - الوفاة (5 إلى 10% من الحالات)	

### اللقاح

يُعتبر اللقاح أفضل وسيلة لحماية طفلكم ضد الخناق والسعال الديكي والكزاز وشلل الأطفال والإنتانات الخطيرة بالهيموفيلوس إنفلونزا B. ويحمي اللقاح المشترك طفلكم ضد كافة هذه الأمراض لكن يجب إعطاء عدة جرعات من اللقاح للحصول على أفضل حماية ممكنة. يحصل الأطفال على 4 جرعات من اللقاح ضد الخناق، والسعال الديكي والكزاز وشلل الأطفال وهييموفيلوس إنفلونزا B في عمر الشهرين، 4 أشهر، 6 أشهر و18 شهراً ويحصلوا على لقاحهم ضد الخناق، والسعال الديكي والكزاز وشلل الأطفال بين 4 و6 سنوات. تُعتبر هذه اللقاحات آمنة.

ردود الفعل المحتملة من اللقاح	ردود الفعل المحتملة من اللقاح	ردود الفعل
ما الذي يجب فعله	بعد تلقي اللقاح بعدة ساعات، يمكن أن يظهر لدى الطفل انتفاخ، حساسية واحمرار في مكان وخز الإبرة (5 إلى 50% من الحالات، حسب عدد الجرعات). ويمكن للانتفاخ أن يمتد إلى العضو بكامله (2% من الحالات بعد الجرعة الخامسة) يمكن أن يظهر في هذا المكان ورم صغير يختفي في الأسابيع اللاحقة.	
- وضع ضماد رطب وبارد على مكان وخز الإبرة.	- قد يصاب الطفل بالحرارة (15 إلى 20% من الحالات، وقد تؤدي الحرارة العالية إلى اختلاجات عند الطفل.	
- أخذ دواء خافض للحرارة مثل أسيتامينوفين إذا بلغت الحرارة 38.5 درجة أو أكثر.	- قد يؤثر اللقاح ردود فعل أخرى مثل قيء، هيجان، نعاس، واندرا بكاء مستمر.	
مراجعة الطبيب حسب خطورة العوارض.	تم الإبلاغ عن حالات نادرة لاستمرار آلام شديدة وضعف في الذراع، لعدة أسابيع (0.5 إلى 1 من كل 100.000 حالة)	
	ردود الفعل التحسسية الخطيرة نادرة.	

في حال حصول رد فعل تحسسي خطير، سيبدأ بعد دقائق من حقن اللقاح، ويمكن للشخص الذي يعطي اللقاح معالجته. لذلك من الأفضل البقاء مع الشخص الملقح لمدة 15 دقيقة على الأقل بعد حقن اللقاح.

للحصول على المزيد من المعلومات، الرجاء التكلّم مع الشخص الذي يعطي اللقاح، أو استشارة المركز المحلي للخدمات الاجتماعية CLSC التابع للمركز الصحي والخدمات الاجتماعية CSSS التابعين له أو استشارة طبيبك.