



اللقاح المشترك ضد الخناق، والسعال الديكي والكزاز

"التلقيح، حماية جيدة"

يحصل الشخص الذي يتلقى هذا اللقاح على حماية ضد الخناق، والسعال الديكي والكزاز ومضاعفاتها.

الكزاز (Tétanos)	السعال الديكي (Coqueluche)	الخناق (Diphtérie)	الأمراض
يسبب الكزاز: - تشنجات عضلية في الفك - تشنجات الحبال الصوتية - تشنجات عضلية في كل الجسم	يسبب السعال الديكي: - نوبات سعال عنيفة قد تستمر أشهراً - صعوبة في تناول الطعام، والشراب والتنفس	يسبب الخناق: - آلام شديدة في الحلق - حرارة عالية - مشاكل تنفسية وقلبية	
المضاعفات للكزاز: - الوفاة (10% من الحالات)	المضاعفات المحتملة للسعال الديكي: - التهاب الرئة - أضرار في الدماغ (حالة من أصل كل 11000 حالة) - الوفاة (0.4% لدى الرضع)	المضاعفات المحتملة للخناق: - شلل - الوفاة (5 إلى 10% من الحالات)	

اللقاح

يُعتبر اللقاح أفضل وسيلة للحماية ضد الخناق والسعال الديكي والكزاز. يُعطى للأشخاص الذين يبلغ عمرهم 7 سنوات أو أكثر، الذين يحتاجون لحماية ضد هذه الأمراض الثلاثة. وفي حال المراهقين وبعض الأشخاص البالغين الذين تلقوا لقاحاً ضد الخناق والكزاز منذ أقل من خمس سنوات، من المبرر إعطائهم لقاح ضد الخناق، والسعال الديكي والكزاز لحمايتهم من السعال الديكي، وذلك بالرغم من تزايد احتمال تعرضهم لردود فعل غير مرغوب فيها في هذه الحالة. يُعتبر اللقاح المشترك ضد الخناق والسعال الديكي والكزاز آمناً.

ما الذي يجب فعله	ردود الفعل المحتملة من اللقاح	ردود الفعل
- وضع ضماد رطب وبارد على مكان وخز الإبرة.	- بعد تلقي اللقاح بعدة ساعات، يمكن أن يظهر لدى الشخص انتفاخ أو احمرار، مع أو بدون حساسية في مكان وخز الإبرة. يمكن أن يظهر في هذا المكان ورم صغير يختفي في الأسابيع اللاحقة.	
- أخذ دواء خافض للحرارة مثل أسيتامينوفين إذا بلغت الحرارة 38.5 درجة أو أكثر.	- قد يصاب الشخص بالحرارة (1 إلى 18% من الحالات)، وآلام في الرأس وفي العضلات مع أو بدون ردود فعل أكثر أهمية في مكان وخز الإبرة.	
تم الإبلاغ عن حالات نادرة لاستمرار آلام شديدة أو ضعف في الذراع، لعدة أسابيع (0.5 إلى 1 من كل 100.000 جرعة) ردود الفعل التحسسية الخطرة نادرة.		
في حال حصول رد فعل تحسسي خطير، سيبدأ بعد دقائق من حقن اللقاح، ويمكن للشخص الذي يعطي اللقاح معالجته. لذلك من الأفضل البقاء مع الشخص الملقح لمدة 15 دقيقة على الأقل بعد حقن اللقاح.		

للحصول على المزيد من المعلومات، الرجاء التكلّم مع الشخص الذي يعطي اللقاح، أو استشارة المركز المحلي للخدمات الاجتماعية CLSC التابع للمركز الصحي والخدمات الاجتماعية CSSS التابعين له أو استشارة طبيبك.