



Vaccin conjugué contre le méningocoque de sérotype C

اللقاح المشترك ضد المكورة السحائية من المجموعة المصلية C

"التلقيح، حماية جيدة"

يحصل الشخص الذي يتلقى هذا اللقاح على حماية ضد المكورة السحائية من المجموعة المصلية C ومضاعفاتها. ويُعتبر التهاب السحايا (إنتان أغلفة الدماغ) وتجرثم الدم بالمكورة السحائية (التهاب الدم) مرضان خطيران سببهما المكورة السحائية. هناك أنواع مختلفة (أو مجموعات مصلية) من المكورة السحائية (A, B, C, Y, W-135). وفي مقاطعة كيبيك، نجد غالباً المجموعة B (التي لا يوجد أي لقاح ضدها) والمجموعة C. ويحمي اللقاح المشترك ضد المكورة السحائية من المجموعة C.

المضاعفات المحتملة لالتهاب المكورة السحائية من المجموعة C هي:	يسبب التهاب المكورة السحائية من المجموعة C:	الأمراض
<ul style="list-style-type: none"> - أضرار دائمة في الدماغ - بتر اليدين أو الرجلين (10 إلى 15% من الحالات) - الوفاة (10 إلى 15% من الحالات) 	<ul style="list-style-type: none"> - حرارة عالية - آلام شديدة في الرأس - غثيان وقيء - تورعك عام - احمرار أو نزوف صغيرة بحجم رأس الدبوس أو بقع زرقاء على الجلد 	

اللقاح

يُعتبر اللقاح أفضل وسيلة للحماية ضد التهاب المكورة السحائية من المجموعة C. وفي مقاطعة كيبيك، تُعطى جرعة من اللقاح في عمر سنة واحدة. كما يُعطى اللقاح أيضاً، ابتداءً من سن الشهرين، للأشخاص الذين يعانون من ظرف صحي يزيد من خطر إصابتهم الخطيرة بالتهاب المكورة السحائية من المجموعة C. يُعتبر اللقاح المشترك ضد التهاب المكورة السحائية من المجموعة C آمناً. وفي أغلب الحالات، لا يؤدي إلى أي رد فعل غير مرغوب.

ما الذي يجب فعله	ردود الفعل المحتملة من اللقاح	ردود الفعل
<ul style="list-style-type: none"> - وضع ضماد رطب وبارد على مكان وخز الإبرة. 	<ul style="list-style-type: none"> - خلال الأيام الثلاثة بعد اللقاح، يمكن أن يظهر لدى الشخص احمرار أو حساسية في مكان وخز الإبرة. - تزداد ردود الفعل هذه مع تقدم العمر، وتتراوح بين 2 إلى 4% لدى الرضع والأطفال صغيري السن جداً وتصيب ثلث الشبان تقريباً الذين يتراوح عمرهم بين 4 سنوات إلى 18 سنة. 	
<ul style="list-style-type: none"> - أخذ دواء خافض للحرارة مثل أسيتامينوفين إذا بلغت الحرارة 38.5 درجة أو أكثر. 	<ul style="list-style-type: none"> - قد يثير اللقاح ردود فعل أخرى، مثل الحرارة، هيجان لدى الأطفال دون سن 18 شهراً، آلام في الرأس لدى الشبان بين 6 سنوات إلى 18 سنة. 	
	ردود الفعل التحسسية الخطيرة نادرة.	
	في حال حصول رد فعل تحسسي خطير، سيبدأ بعد دقائق من حقن اللقاح، ويمكن للشخص الذي يعطي اللقاح معالجته. لذلك من الأفضل البقاء مع الشخص الملقح لمدة 15 دقيقة على الأقل بعد حقن اللقاح.	

للحصول على المزيد من المعلومات، الرجاء التكلّم مع الشخص الذي يعطي اللقاح، أو استشارة المركز المحلي للخدمات الاجتماعية CLSC التابع للمركز الصحي والخدمات الاجتماعية CSSS التابعين له أو استشارة طبيبك.