



## 預防肺炎球菌的聯合疫苗

“接種疫苗是一種很有效的預防手段”。

讓孩子接種疫苗，就是給予孩子抵禦嚴重的肺炎球菌感染及其並發症的最有效保護。腦膜炎（腦子的包膜被感染）和菌血症（血的感染）是兩種由肺炎球菌導致的疾病。肺炎球菌有好幾種類型。聯合疫苗能預防孩子身上最常見的七種類型的肺炎球菌。

	肺炎球菌傳播的途徑:	肺炎球菌的感染會導致:	肺炎球菌的感染可能導致的並發症:
疾病	- 接觸被感染者從鼻子、喉嚨裏排出的分泌物。	- 耳炎 - （鼻）竇炎 - 肺炎 - 腦膜炎 - 菌血症（血的感染）	- 耳聾 - 永久性腦損傷 - 死亡

## 疫苗

接種疫苗是防止您的孩子遭受肺炎球菌嚴重感染的最佳手段。預防肺炎球菌的聯合疫苗可從孩子2個月起就給他注射。劑量數根據孩子的年齡而定。力薦給所有2個月到4歲的孩子注射這種疫苗，尤其要給那些身體狀況易增加肺炎球菌嚴重感染的危險，或是上托兒所的孩子注射這種疫苗。

預防肺炎球菌的聯合疫苗是安全的。

	疫苗可能引起的反應	應該怎樣做
反應	- 接種疫苗之後的48個小時裏，在給孩子注射疫苗的地方可能會出現紅腫和感覺敏感（10%到36%的病例）。	- 在注射的地方敷一塊潮濕的冷紗布。
	- 孩子可能會輕度發燒（15%到25%的人）或是發高燒（不到2.5%的情況）。如孩子發高燒，可能會出現抽搐。	- 如果體溫達到攝氏38.5度以上，可服用撲熱息痛的（解熱鎮痛）類退燒藥。
	- 疫苗會引起其他的反應，例如易怒、胃口和睡眠發生變化、嘔吐、腹瀉、發疹。	- 如果症狀嚴重，應及時就醫。
嚴重的過敏反應屬例外情況。		
如果要發生嚴重的過敏反應，那麼在注射之後的幾分鐘就會開始，執行注射者懂得處理這種反應。因此，要求受接種者在注射後至少在現場逗留 15 分鐘。		

如想瞭解更多情況，請詢問疫苗注射者，或者去您居住區的 CSSS（醫療衛生與社會服務中心）屬下的 CLSC（當地居民社區服務中心）就診，也可去找醫生。