



## 預防狂犬病疫苗

“接種疫苗是一種很有效的預防手段”。

接受這種疫苗注射的人能夠預防狂犬病。狂犬病是一種置人於死地的疾病，牠是由一種使某些動物受感染的病毒導致的。在傷口可能暴露於狂犬病的病毒之後，應該立即用水和肥皂來連續沖洗瘡口好幾分鐘。

	狂犬病傳播的途徑：	狂犬病會導致：	狂犬病可能引起的並發症：
疾病	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 被得了狂犬病的動物咬傷，或是接觸了沾有這頭動物口水的瘡口或粘膜。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 被咬之處感到疼痛和麻木</li> <li>- 煩躁不安</li> <li>- 吞嚥困難</li> <li>- 抽搐</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 如果沒有注射過疫苗的話，所有病人最終都會死亡。</li> </ul>

需多次注射疫苗。必須遵守約定的疫苗接種日期，才能使疫苗充分發揮效力。

下次接種疫苗的約定日期：

---



---



---



---

## 疫苗

當一個人被一頭有可能得了狂犬病的動物咬過之後，或是接觸了沾有這頭動物口水的瘡口或粘膜之後，就應注射這種疫苗。對於存在暴露於狂犬病病毒危險的人也可注射這種疫苗。

預防狂犬病的疫苗是安全的。

	疫苗可能產生的反應	應該怎樣做
反應	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 受接種者在注射過疫苗的地方可能會感覺敏感，會出現紅腫或是發癢（10%到25%的情況）。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 在注射疫苗的地方敷一塊潮濕的冷紗布。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 疫苗可能會誘發其他的輕微反應，例如頭痛、噁心、肚子疼、暈眩、肌肉疼痛、關節疼痛、發燒（1%到20%的情況）。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 如果症狀嚴重，應及時就醫。</li> </ul>
嚴重的過敏反應情況很少。		
如果要發生嚴重的過敏反應的話，那麼在注射之後的幾分鐘就會開始，執行注射者懂得處理這種反應。因此，要求受接種者在注射後至少在現場逗留 15 分鐘。		

如想瞭解更多情況，請詢問疫苗注射者，或者去您居住區的 CSSS（醫療衛生與社會服務中心）屬下的 CLSC（當地居民社區服務中心）就診，也可去找醫生。