

## Vaccin d<sub>2</sub>T<sub>5</sub>-Polio



### d<sub>2</sub>T<sub>5</sub>-Polio 疫苗 預防白喉、破傷風和小兒麻痺症的組合疫苗

“接種疫苗是一種很有效的預防手段”。

這種疫苗的受接種者能夠預防白喉、破傷風、小兒麻痺症及其並發症。

	白喉 (Diphtérie)	破傷風 (Tétanos)	小兒麻痺症 (Polio)
疾病	<b>白喉會導致：</b> - 嚴重喉嚨痛 - 發高燒 - 呼吸道和心臟問題	<b>破傷風會導致：</b> - 頷部肌肉痙攣 - 聲帶痙攣 - 全身肌肉痙攣	小兒麻痺症會導致： - 發燒 - 噁心和嘔吐 - 渾身不舒服 - 手臂和腿癱瘓（1%的病例）
	白喉可能引起的並發症： 癱瘓 死亡（5%到10%的病例）	破傷風可能引起的並發症： - 死亡（10%的病例）	小兒麻痺症可能引起的並發症： - 呼吸道問題 永久性癱瘓（近50%的住院病例） 死亡（5%的住院病例）

## 疫苗

接種疫苗是預防白喉、破傷風和小兒麻痺症的最佳手段。7歲以上有預防這三種疾病需要的人應注射這種疫苗。預防白喉、破傷風和小兒麻痺症的組合疫苗是安全的。

	對疫苗可能產生的反應	應該怎樣做
反應	接種疫苗幾個小時之後，受接種者在注射過的地方會出現紅腫脹，同時感覺敏感，也可能沒有敏感的感覺（10%到85%的人，視劑量的份數而定）。 有可能在同樣的地方會出現一個小丘疹，但幾個星期之後就會消失。	- 在注射疫苗的地方敷一塊潮濕的冷紗布。
	受接種者可能會發燒（0.5到10 %的情況），被注射的地方也許會伴隨出現更加嚴重的反應，但也許不會。	- 如果體溫達到攝氏38.5度以上，可服用撲熱息痛的（解熱鎮痛）類退燒藥。
	據報告，受接種者可能在連續好幾個星期內感到手臂嚴重疼痛和無力，但這樣的例子極少（10萬份劑量中的0.5到1份劑量的比例）。	
	嚴重的過敏反應屬例外情況（100萬份劑量中的1到6份劑量的比例）。	
	如果會發生嚴重的過敏反應，那麼在注射之後的幾分鐘就會開始，執行注射者懂得處理這種反應。因此，要求受接種者在注射後至少在現場逗留 15 分鐘。	

如想瞭解更多情況，請詢問疫苗注射者，或者去您居住區的 CSSS（醫療衛生與社會服務中心）屬下的 CLSC（當地居民社區服務中心）就診，也可去醫生。