



dCaT 疫苗

白喉、百日咳和破傷風的組合疫苗

“接種疫苗是一種很有效的預防手段”。

接受這種疫苗注射的人能夠預防白喉、百日咳、破傷風及其並發症。

	白喉 (Diphthérie)	百日咳 (Coqueluche)	破傷風 (Tétanos)
疾病	白喉會導致： - 嚴重喉嚨痛 - 發高燒 - 呼吸道和心臟問題	百日咳會導致： - 連續幾個月的兇猛陣咳 - 進食、喝水和呼吸都有困難	破傷風會導致： - 頷部肌肉痙攣 - 聲帶痙攣 - 全身肌肉痙攣
	白喉可能引起的並發症： - 癱瘓 - 死亡（5%到10%的病例）	百日咳可能引起的並發症： - 肺炎 - 腦損傷（11000例中有1例） - 死亡（嬰兒中有0.4%）	破傷風可能引起的並發症： - 死亡（10%的病例）

疫苗

接種疫苗是預防白喉、百日咳和破傷風的最佳手段。這種疫苗是給7歲以上的需要預防這三種疾病的人們注射的。如果遇到屬於這種情況的青少年和某一些成人，即使他們在五年之內曾經打過白喉和破傷風預防針，也仍有必要給他們接種預防白喉、百日咳和破傷風（dCaT）的疫苗，以預防百日咳，儘管在這種情況下有增加不良反應的可能也值得。

預防白喉、百日咳和破傷風的組合疫苗是安全的。

	對疫苗可能產生的反應	應該怎樣做
反應	- 接種疫苗幾個小時之後，受接種者在注射過的地方會出現紅腫，同時伴有敏感的感覺，也可能感覺不到敏感。有可能在同樣的地方會出現一個小丘疹，但幾個星期之後就會消失。	- 在注射疫苗的地方敷一塊潮濕的冷紗布。
	- 受接種者可能會發燒（1%到18%的比例），感到頭痛和肌肉疼痛，在被注射過的地方也許會伴隨著出現更加嚴重的反應，但也許不會。	- 如果體溫達到攝氏38.5度以上，可服用撲熱息痛的（解熱鎮痛）類退燒藥。
	只有極少數人反映有過持續好幾個星期的雙臂疼痛和無力的反應（10萬份劑量中的0.5到1份的比例）。	
	- 嚴重的過敏反應屬例外情況。	
	如果要發生嚴重的過敏反應，那麼在注射之後的幾分鐘就會開始，執行注射者懂得處理這種反應。因此，要求受接種者在注射後至少在現場逗留 15 分鐘。	

如想瞭解更多情況，請詢問疫苗注射者，或者去您居住區的 CSSS（醫療衛生與社會服務中心）屬下的 CLSC（當地居民社區服務中心）就診，也可去找醫生。