



C 型血清群腦膜炎雙球菌聯合疫苗

“接種疫苗是一種很有效的預防手段”。

接受這種疫苗接種的人能夠預防C型血清群腦膜炎雙球菌的感染及其並發症。腦膜炎（腦子的包膜被感染）以及腦膜炎球菌血症（血感染）是兩種由腦膜炎雙球菌導致的嚴重疾病。腦膜炎雙球菌有好幾個種類（或血清群）（A, B, C, Y, W-135）。

在魁北克，尤其還存在著B型血清群（對付B型血清群現尚無任何疫苗）和C型血清群。聯合疫苗能預防C型血清群腦膜炎雙球菌。

疾病	C 型血清群腦膜炎雙球菌的感染會導致：	C 型血清群腦膜炎雙球菌感染可能引起的並發症：
	<ul style="list-style-type: none"> - 發高燒 - 嚴重頭痛 - 噁心和嘔吐 - 反應遍及全身 - 皮膚上呈現紅色或是出現像大頭針般大小的出血，或者是出現烏青。 	<ul style="list-style-type: none"> - 永久性腦損傷 - 截手或截腳（10%到 15%的病例） - 死亡（10%到 15%）

疫苗

接種疫苗是預防 C 型血清群腦膜炎雙球菌感染的最佳手段。在魁北克，通常給一歲的孩子注射一份劑量的疫苗。對那些身體狀況具有增加被 C 型血清群腦膜炎雙球菌嚴重感染危險的孩子，從 2 個月起就可注射這種疫苗。

預防 C 型血清群腦膜炎雙球菌的聯合疫苗是安全的。在大多數情況下，這種疫苗不會誘發任何不良反應。

	對疫苗可能產生的反應	應該怎樣做
反應	<ul style="list-style-type: none"> - 接種疫苗之後的3天內，受接種者在注射過的地方可能會出現紅色或有感覺敏感。 <p>這些反應隨著年齡而增強，嬰兒和非常年幼的孩子中有反應的人數是2%到4%，而4歲到18歲的兒童和青少年中則有將近三分之一的人會有反應。</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 在注射疫苗的地方敷一塊潮濕的冷紗布。
	<ul style="list-style-type: none"> - 疫苗還可能引發其他反應，例如18個月以下的孩子可能會發燒、易怒，6歲到18歲的兒童和青少年則可能會感到頭痛。 	<ul style="list-style-type: none"> - 如果體溫達到攝氏38.5度以上，可服用撲熱息痛的（解熱鎮痛）類退燒藥。
嚴重的過敏反應屬例外情況。		
如果會發生嚴重的過敏反應，那麼在注射之後的幾分鐘就會開始，執行注射者懂得處理這種反應。因此，要求受接種者在注射後至少在現場逗留 15 分鐘。		

如想瞭解更多情況，請詢問疫苗注射者，或者去您居住區的 CSSS（醫療衛生與社會服務中心）屬下的 CLSC（當地居民社區服務中心）就診，也可去找醫生。