

Vaccin contre l'hépatite B



VACUNA CONTRA LA HEPATITIS B

“La vacunación, una buena protección”

La persona que recibe esta vacuna está protegida contra la hepatitis B y sus complicaciones. La hepatitis B es una infección del hígado causada por un virus (VHB).

	La hepatitis B se transmite por:	La hepatitis B causa:	Las complicaciones posibles de la hepatitis B son:
Enfermedad	<ul style="list-style-type: none"> - El contacto de una mucosa o una herida con la sangre, el esperma o las secreciones vaginales de una persona infectada. 	<ul style="list-style-type: none"> - fiebre - fatiga - pérdida de apetito - ictericia (piel amarillenta) - dolores de cabeza 	<ul style="list-style-type: none"> - problemas graves en el hígado - infección crónica del hígado (10 % de los adultos, y hasta el 90 % de los bebés) - cirrosis - cáncer del hígado - la muerte (1 % de los casos)

LA VACUNA

La vacunación es el mejor modo de protegerse contra la hepatitis B y sus complicaciones. La vacuna está indicada para toda persona que desee reducir el riesgo de contraer la hepatitis B. Es necesaria más de una dosis para tener la mejor protección posible.

La vacuna contra la hepatitis B es segura. En la mayoría de los casos, no provoca ninguna reacción adversa.

	Posibles reacciones ante la vacuna	Qué hacer
Reacciones	Se puede notar una ligera sensibilidad, hinchazón y rojez (del 3 al 29 % de los casos) en el lugar donde se administró la inyección.	Aplicar una compresa húmeda y fría en el lugar donde se administró la inyección.
	Puede darse fiebre (del 1 al 6 % de los casos).	Administrar un medicamento contra la fiebre del tipo acetaminofeno si la temperatura es de 38,5°C o más.
	La vacuna puede provocar otras reacciones (menos del 1% de los casos), como por ejemplo dolores de cabeza, problemas digestivos, mareos o fatiga.	Consultar a un médico, dependiendo de la gravedad de los síntomas.
	Las reacciones alérgicas graves son raras (1 entre 100.000 dosis).	

Si se produjera una reacción alérgica grave, ésta comenzaría a los pocos minutos, y la persona que administra la vacuna puede tratar dicha reacción. Por esa razón, se recomienda quedarse en la clínica al menos 15 minutos después de la administración de la vacuna.

Para obtener más información, hable con la persona encargada de administrar la vacuna, o consulte al CLSC de su centro sanitario y de servicios sociales (CSSS) o a su médico.