

Vaccin contre l'hépatite A

VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A



“La vacunación, una buena protección”

Le persona que recibe esta vacuna está protegida ante la hepatitis A y sus complicaciones. La hepatitis A es una infección del hígado causada por un virus (VHA).

	La hepatitis A se transmite por:	La hepatitis A causa:	Las posibles complicaciones de la hepatitis A son:
Enfermedades	<ul style="list-style-type: none"> - Contacto con agua o alimentos contaminados por las heces de una persona infectada. <p><i>A menudo, los niños no presentan síntomas, pero pueden transmitir la hepatitis A a las personas de su entorno cercano.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - fiebre - cansancio - pérdida de apetito - ictericia (piel amarillenta) - dolores de cabeza 	<ul style="list-style-type: none"> - daños graves al hígado - cansancio durante varias semanas - la muerte (del 0,1 al 0,3 % de los casos)

LA VACUNA

La vacunación es el mejor modo de protegerse contra la hepatitis A y sus complicaciones. La vacuna está indicada para todas las personas que deseen reducir el riesgo de contraer la hepatitis A y sus complicaciones. Es necesario recibir más de una dosis de la vacuna para conseguir la mejor protección posible. La vacuna contra la hepatitis A es segura.

	Posibles reacciones ante la vacuna	Qué hacer
Reacciones	<ul style="list-style-type: none"> - En el transcurso de las 24 horas después de haber recibido la vacuna, se puede notar una ligera sensibilidad (del 12 al 52 % de los casos), hinchazón y rojez (del 4 al 13 % de los casos) en el lugar donde se administró la inyección. 	<ul style="list-style-type: none"> - Aplicar una compresa húmeda y fría en el lugar donde se administró la inyección.
	<ul style="list-style-type: none"> - La vacuna puede provocar otras reacciones, como por ejemplo dolores de cabeza, malestar, dolores en las articulaciones, cansancio, fiebre, náuseas y vómitos, diarrea, o pérdida de apetito. Estas reacciones son benignas y desaparecen en menos de 24 horas. <p>Las reacciones alérgicas graves son raras.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Consultar a un médico, dependiendo de la gravedad de los síntomas.
<p>Si se produjera una reacción alérgica grave, ésta comenzaría a los pocos minutos, y la persona que administra la vacuna puede tratar dicha reacción. Por esa razón, se recomienda quedarse en la clínica al menos 15 minutos después de la administración de la vacuna.</p>		

Para obtener más información, hable con la persona que administra la vacuna, o consulte el CLSC de su centro sanitario y de servicios sociales (CSSS) o a su médico.