

Vaccin conjugué contre le pneumocoque



LA VACUNA NEUMOCÓCICA CONJUGADA

“La vacunación, una buena protección”

Al vacunar a sus hijos, les protege de infecciones graves causadas por el neumococo y sus complicaciones. La meningitis (infección de la membrana del cerebro) y la bacteriemia (infección de la sangre) son dos enfermedades graves causadas por el neumococo. Existen varios tipos de neumococo. La vacuna conjugada protege contra los 7 tipos más frecuentes entre los niños.

Enfermedades	El neumococo se transmite por:	La infección por el neumococo causa:	Las posibles complicaciones de la infección por el neumococo son:
	<ul style="list-style-type: none"> - Contacto con las secreciones de la nariz y la garganta de una persona infectada. 	<ul style="list-style-type: none"> - otitis - sinusitis - neumonía - meningitis - bacteriemia (infección de la sangre) 	<ul style="list-style-type: none"> - sordera - daños permanentes al cerebro - la muerte

LA VACUNA

La vacunación es el mejor modo de proteger a sus hijos contra las infecciones graves causadas por el neumococo. La vacuna neumocócica conjugada está indicada para los niños de 2 meses a 4 años. El número de dosis que deben recibirse varía según la edad y la condición médica del niño.

La vacuna neumocócica conjugada es segura.

	Posibles reacciones ante la vacuna	Qué hacer
Reacciones	<ul style="list-style-type: none"> - En el transcurso de las 24 horas después de haber recibido la vacuna, se puede tener rojez, hinchazón y sensibilidad en el lugar donde se administró la inyección (del 10 al 36 % de los casos). 	<ul style="list-style-type: none"> - Aplicar una compresa húmeda y fría en el lugar donde se administró la inyección.
	<ul style="list-style-type: none"> - El niño puede sufrir una ligera fiebre (del 15 al 25 % de los casos) o una fiebre elevada (menos del 2,5 % de los casos). Una fiebre muy elevada puede causar convulsiones en el niño. 	<ul style="list-style-type: none"> - Administrar un medicamento contra la fiebre del tipo acetaminofeno si la temperatura es de 38,5°C o más.
	<ul style="list-style-type: none"> - La vacuna puede provocar otras reacciones, como irritabilidad y cambios en el apetito y el sueño, vómitos, diarrea y erupciones. 	<ul style="list-style-type: none"> - Consultar a un médico, dependiendo de la gravedad de los síntomas.
Las reacciones alérgicas graves son excepcionales.		

Si se produjera una reacción alérgica grave, ésta comenzaría a los pocos minutos, y la persona que administra la vacuna puede tratar dicha reacción. Por esa razón, se recomienda quedarse en la clínica al menos 15 minutos después de la administración de la vacuna.

Para obtener más información, hable con la persona que administra la vacuna, o consulte el CLSC de su centro sanitario y de servicios sociales (CSSS) o a su médico.