



VACUNA CONTRA LA RABIA

“La vacunación, una buena protección”

La persona que recibe esta vacuna se protege contra la rabia. La rabia es una enfermedad mortal causada por un virus que infecta a ciertos animales. Tras una posible exposición a la rabia, es necesario lavar la herida con agua y jabón durante varios minutos.

Enfermedades	La rabia se transmite por:	La rabia causa:	Las posibles complicaciones de la rabia son:
	<ul style="list-style-type: none"> - la mordedura de un animal que tenga la rabia, o el contacto de una herida o mucosa con su saliva. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dolor e hinchazón en el lugar de la mordedura - agitación - dificultad para tragar - convulsiones 	<ul style="list-style-type: none"> - muerte en todos los casos si no se está vacunado

La vacuna se administra en varias dosis. Es muy importante respetar el calendario fijado para la vacunación para que la vacuna sea totalmente eficaz.

Próximas citas para la vacuna:

LA VACUNA

La vacuna se administra cuando una persona ha sido mordida por un animal que pueda tener la rabia, o una persona que tenga una herida o mucosa que haya estado en contacto con la saliva del animal. Puede asimismo administrarse cuando una persona corre el riesgo de verse expuesta al virus de la rabia.

La vacuna contra la rabia es segura.

Reacciones	Posibles reacciones ante la vacuna	Qué hacer
	<ul style="list-style-type: none"> - La persona puede experimentar sensibilidad, rojez, hinchazón o picor en el lugar donde se administró la inyección (del 10 al 25 % de los casos). 	<ul style="list-style-type: none"> - Aplicar una compresa húmeda y fría en el lugar donde se administró la inyección.
	<ul style="list-style-type: none"> - La vacuna puede provocar otras reacciones benignas, tales como dolores de cabeza, náusea, dolor de barriga, mareo, dolores musculares, dolores en las articulaciones, o fiebre (del 1 al 20 % de los casos). 	<ul style="list-style-type: none"> - Consultar a un médico, dependiendo de la gravedad de los síntomas.
Las reacciones alérgicas graves son raras.		
Si se produjera una reacción alérgica grave, ésta comenzaría a los pocos minutos, y la persona que administra la vacuna puede tratar dicha reacción. Por esa razón, se recomienda quedarse en la clínica al menos 15 minutos después de la administración de la vacuna.		

Para obtener más información, hable con la persona que administra la vacuna, o consulte el CLSC de su centro sanitario y de servicios sociales (CSSS) o a su médico.