



LA VACUNA MENINGOCÓCICA CONJUGADA DEL SEROGRUPO C

“La vacunación, una buena protección”

La persona que recibe esta vacuna se protege contra la infección de meningococo del serogrupo C y sus complicaciones. La meningitis (infección de la membrana del cerebro) y la meningococemia (infección de la sangre) son dos enfermedades graves causadas por el meningococo. Existen diferentes tipos (o serogrupos) de meningococo (A, B, C, Y, W-135).

En Quebec, se encuentra principalmente el serogrupo B (contra el cual no existe vacuna) y el serogrupo C. La vacuna conjugada protege contra el meningococo del serogrupo C.

Enfermedad	La infección de meningococo de serogrupo C causa:	Las posibles complicaciones de la infección de meningococo del serogrupo C son:
	<ul style="list-style-type: none"> - Fiebre alta - Dolores de cabeza fuertes - Náuseas y vómitos - Malestar general - Rojeces o pequeñas hemorragias del tamaño de la cabeza de un alfiler o moratones en la piel 	<ul style="list-style-type: none"> - Daños permanentes al cerebro - Amputación de las manos o los pies (del 10 al 15 % de los casos) - la muerte (del 10 al 15 % de los casos)

LA VACUNA

La vacunación es el mejor modo de protegerse contra la infección de meningococo del serogrupo C. En Quebec, se administra una dosis de la vacuna a la edad de 1 año. La vacuna se administra igualmente, a partir de los 2 meses de edad, a las personas que sufran de una condición médica que aumente el riesgo de infección grave de meningococo del serogrupo C.

La vacuna neumocócica conjugada del serogrupo C es segura. En la mayoría de los casos, no provoca ninguna reacción indeseada.

	Posibles reacciones ante la vacuna	Qué hacer
Reacciones	<ul style="list-style-type: none"> - En el transcurso de los 3 días después de haber recibido la vacuna, la persona puede experimentar una rojez o sensibilidad en el lugar donde se administró la inyección. <p>Estas reacciones aumentan con la edad, pasando del 2 al 4 % de los bebés y niños pequeños, a casi la tercera parte de los niños y jóvenes de 4 a 18 años.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Aplicar una compresa húmeda y fría en el lugar donde se administró la inyección.
	<ul style="list-style-type: none"> - La vacuna puede provocar otras reacciones, como fiebre, irritabilidad en niños menores de 18 meses, y dolores de cabeza en niños y jóvenes de 6 a 18 años. 	<ul style="list-style-type: none"> - Administrar un medicamento contra la fiebre del tipo acetaminofeno si la temperatura es de 38,5°C o más.
Las reacciones alérgicas graves son raras.		
Si se produjera una reacción alérgica grave, ésta comenzaría a los pocos minutos, y la persona que administra la vacuna puede tratar dicha reacción. Por esa razón, se recomienda quedarse en la clínica al menos 15 minutos después de la administración de la vacuna.		

Para obtener más información, hable con la persona que administra la vacuna, o consulte el CLSC de su centro sanitario y de servicios sociales (CSSS) o a su médico.